



# **Patientinformation inden en øjenprovokation**

### **Hvad er en øjenprovokationstest:**

En øjenprovokation vil afklare om dit barn reagerer med allergiske symptomer på netop det allergenekstrakt, der senere hen ville blive anvendt i et evt. vaccinationsforløb.

Hvis der påtænkes allergivaccination, vil det derfor i de fleste tilfælde være hensigtsmæssigt at lave en øjenprovokation, for at sikre at barnet har mulighed for at få effekt af vaccinationen.

### **Hvordan foregår en øjenprovokationstest:**

Testen varer ca. 1 time.

- Sygeplejersken drypper 1 dråbe allergenekstrakt i skiftevis højre og venstre øje.
- Der dryppes i alt 6 gange med 10 minutters interval
- For hver dryp vil koncentrationen af allergenekstrakt øges.
- Testen er færdig når dit øje bliver rødt og/eller kløende eller når den maksimale dosis er givet.
- Får du røde og/eller kløende øjne er testen positiv.
- Får du ikke en reaktion, er testen negativ.

### **Forberedelser før testen:**

#### **Medicin pause:**

Hvis du er i behandling med astmamedicin skal du ikke holde pause med det inhalerede medicin (Diskos, Spray, Turbuhaler, Autohaler osv).

Du må dog ikke anvende:

- Astmatablet (Singulair, Montelukast) 24 timer før.
- Antihistamintabletter/høfeberpiller 72 timer før testen.
- Lomudal øjendråber, antihistamin øjendråber og antihistamin næsespray 24 timer før.

Har du indenfor 72 timer før provokationen været nødt til at anvende allergipiller, bedes du ringe til klinikken og aftale en ny dag til provokationen.